



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και [www.agrotypos.gr](http://www.agrotypos.gr))

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη  
Τηλ. 2310 476662  
[pkpfpet1@otenet.gr](mailto:pkpfpet1@otenet.gr)

**No 19 / 13 Ιουνίου 2012**

Βάιος Πολυμέρου  
Ευγενία Μακρίδου

### **ΟΡΕΙΝΕΣ – ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ**

#### **ΜΗΛΙΑ**

##### **A. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ** (Προσβάλλει επίσης *ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ, ΚΑΡΥΔΙΑ*)

- Αρχισε η 2<sup>η</sup> πτήση του εντόμου.
- Η έναρξη των εκκολάψεων αναμένεται περίπου στις 23 - 24 Ιουνίου
- Συνιστάται σε κτήματα που παρουσιάζουν κάθε χρόνο σοβαρές προσβολές να γίνει ψεκασμός:
  - Από **16-18 Ιουνίου** με ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ ή ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ **ή**
  - Από **18 -21 Ιουνίου** με ρυθμιστές (ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ, ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ) **ή**
  - Στις **22 -23 Ιουνίου** με ΙΟΛΟΓΙΚΟ εντομοκτόνο CpGV
  - Από **23-25 Ιουνίου** με κλασσικά εντομοκτόνα όπως ΦΟΣΜΕΤ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠΙ, Τ-ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ, ΕΜΑΜΕΚΤΙΝ ΜΠΕΝΖΟΑΤΕ (Σκεύασμα AFFIRM), κ.α.
  - Η επέμβαση να επαναληφθεί μετά 2- 3 βδομάδες, **ανάλογα με το αγροχημικό.**
- **ΣΗΜ. 1:** Σε κτήματα με ελαφρές προσβολές συστήνεται να γίνει μόνο μία εφαρμογή με ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ στις 24-25 Ιουνίου ή με ΚΛΑΣΣΙΚΑ - ΙΟΛΟΓΙΚΑ στις 29-30 Ιουνίου.

##### **B. ΝΑΡΚΗ (Μηλιά)**

Δεν απαιτείται χωριστή εφαρμογή. Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

##### **Γ. ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ( Κόσσοι- Ζευζέρα- Καπνώδης).**

Να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπισή τους με ψεκασμούς το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

- ♦ Για τον κόσσο και τον καπνώδη ο ψεκασμός να κατευθύνεται στο λαιμό και στον κορμό.
- ♦ Για τη ζευζέρα ο ψεκασμός να κατευθύνεται στις κορυφές.

Κατάλληλα αγροχημικά: ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ (Διάφορα σκευάσματα), κ.ά.

Συνιστάται η συνδυασμένη καταπολέμηση με την Καρπόκαψα με επιλογή κατάλληλου αγροχημικού.

## **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ**

**ΒΑΜΒΑΚΑΙΑ**. (Προσβάλλει και την ακτινιδιά)

Αναμένεται η εμφάνιση των νεαρών προνυμφών της β' γενεάς. Μόνο σε κτήματα που απέτυχαν ή δεν έγιναν εφαρμογές κατά τους μήνες Απρίλιο - Μάιο και παρουσιάζουν προσβολές συνιστάται καταπολέμηση.

**A.** Σε σοβαρές προσβολές να γίνει ψεκασμός 1 - 2 Ιουλίου και επανάληψη μετά από 12 - 14 ημέρες.

**B.** Σε ελαφρές προσβολές να γίνει μόνο μία εφαρμογή 8-10 Ιουλίου

**Γ.** Κατάλληλα αγροχημικά: ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ, ΧΛΩΡΙΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΙΠΥΡΙΦΟΣ-ΜΕΘΥΛ, ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ.

## **ΚΕΡΑΣΙΑ**

**ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ**. (Gnomonia erythrostoma) - **ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΟ**. (Cylindrosporium padi).

Σε κτήματα που εμφανίζονται προσβολές (κηλίδωση των φύλλων) να εφαρμοσθεί μετά τη συγκομιδή ψεκασμός με ΝΤΟΝΤΙΝ.

**ΣΗΜ.1.:** Τα προσβεβλημένα φύλλα από ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ παραμένουν στο δένδρο και μετά τη φυλλόπτωση του φθινοπώρου, ενώ αντίθετα τα προσβεβλημένα φύλλα από ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΟ πέφτουν πρόωρα.

**ΣΗΜ.2.:** Περισσότερες πληροφορίες για τα συμπτώματα μπορείτε να βρείτε στο Δελτίο Νο7/2-4-12

## **ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ**

## **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ**

**ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ - ΑΝΑΡΣΙΑ**

Αρχισε η 2<sup>η</sup> πτήση και των δύο εντόμων και είναι συνεχής.

Συνιστάται η προστασία των καρπών από το στάδιο αλλαγής χρώματος. Κατάλληλα αγροχημικά: ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠΙ, ΧΛΩΡΙΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΙΠΥΡΙΦΟΣ-ΜΕΘΥΛ, ΕΜΑΜΕΚΤΙΝ ΜΠΕΝΖΟΑΤΕ (Σκεύασμα AFFIRM), κ.α.

- **ΣΗΜ. :** Ειδικά για τις όψιμες ποικιλίες και σε κτήματα που παρουσιάζουν προσβολές, συνιστάται ένα πρόγραμμα κάλυψης, το οποίο υπολογίζεται από την αναμενόμενη ημερομηνία συγκομιδής. Συνιστώνται τρεις εφαρμογές στις 40, 28 και 16 ημέρες πριν την συγκομιδή.

## **ΛΑΜΑΣΚΗΝΙΑ**

**ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Laspeyresia funebrana)**

Οπου σημειώνονται προσβολές να γίνει καταπολέμηση τις ίδιες ημερομηνίες με την Καρπόκαψα της μηλιάς με κατάλληλο αγροχημικό, ειδικά στις όψιμες ποικιλίες.

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης  
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη