



## No 41 / 14 Ιουλίου 2014

Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

## ΠΕΔΙΝΕΣ - ΠΡΩΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

**ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ****A. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (*Cydia pomonella* L., Lepidoptera: Tortricidae)**

- Ξεκίνησε η 3<sup>η</sup> πτήση του εντόμου. Η έναρξη των ωτοκιών υπολογίζεται από τις 16 Ιουλίου. Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται στις 21 Ιουλίου.
- Κατάλληλος χρόνος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

		Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	<b>22-24 Ιουλίου</b> και δύο επαναλήψεις <b>30 Ιουλίου - 1 Αυγούστου</b> και <b>7-9 Αυγούστου</b>	CpGV (9)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	<b>17-20 Ιουλίου</b> και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Chlorantraniliprole (2), Fenoxy carb (2), Diflubenzuron (4), Methoxyfenozide (3)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	<b>22-24 Ιουλίου</b> και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Beta-cyfluthrin (2), Chlorpyrifos (2), Chlorpyrifos-methyl (1), Cyfluthrin (1), Deltamethrin (2), Emamectin* (3), Etofenprox* (3), Indoxacarb (3), Lambda cyhalothrin (2), Phosmet (1), Spinosad (3), tau-Fluvalinate (2), Thiacloprid (1)

- Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.
- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες (*Phyllonorycter blancarella* και *Phyllonorycter corylifoliella*, Lepidoptera: Gracillariidae).
- \* Έγκριση μόνο για μηλιά



## B. ΣΑΝ ZOZE, Ψώρα του San José (*Quadraspidiotus perniciosus*, Homoptera: Diaspididae)

- Δεν συνιστάται γενική καταπολέμηση (οι επεμβάσεις για την καρπόκαψα καλύπτουν και το έντομο αυτό).
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Fenoxy carb, Paraffin oil, Spirotetramat.

## ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

### ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (*Cydia funebrana* Treitschke, Lepidoptera: Tortricidae)

- Η πτήση των ενήλικων της 3<sup>ης</sup> γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης:
  - Chlorantraniliprole, Diflubenzuron **14-18 Ιουλίου**.
  - Chlorpyrifos, Deltamethrin **19-21 Ιουλίου**.

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη