

**No 20 / 17 Απριλίου 2014**

Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

ΠΕΔΙΝΕΣ - ΠΡΩΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ**ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ**

(Anarsia lineatella Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae)

- Ξεκίνησε η 1^η πτήση που θα δώσει την 1^η γενιά.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

	Οπωρώνες με ιστορικό μειωμένης προσβολής	Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	1-3 Μαΐου	Bacillus thuringiensis spp. Aizawai (2), Bacillus thuringiensis var. Kurstaki
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	22-29 Απριλίου	Chlorantraniliprole (2), Chlorantraniliprole + Thiamethoxam (1-2), Diflubenzuron (2)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	1-3 Μαΐου	Beta-cyfluthrin (2), Chlorpyrifos (2), Chlorpyrifos-methyl (1), Cyfluthrin (1), Deltamethrin (2), Emamectin (3), Indoxacarb (3), Phosmet (2), Spinosad (3)

- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- Σε περίπτωση που σκοπεύετε να εφαρμόσετε σύστημα παρεμπόδισης συζεύξεων (mating disruption), η τοποθέτηση των εξατμιστήρων να γίνει άμεσα με την παραλαβή του Δελτίου.
- Η επέμβαση για την Ανάρσια καταπολεμά αποτελεσματικά και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαγα ροδακινιάς) (*Grapholitha molesta* Busck, Lepidoptera: Torticidae). Συνήθως οι επεμβάσεις αυτές ελέγχουν ικανοποιητικά και αφίδες και θρίπες.

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη