



No 19 / 17 Απριλίου 2014

Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΚΕΡΑΣΙΑ

ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ (*Gnomonia erythrostoma*) – Ατελής μορφή το *Cylindrosporium pruni-cerasi*)

- Οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται στο στάδιο Η (δέσιμο) έως Ι (απόσπαση του κάλυκα).
- Τα προσβεβλημένα φύλλα παρουσιάζουν διάσπαρτες, μικρές, πολυάριθμες υποκίτρινες ή υπέρυθρες κηλίδες που αργότερα γίνονται καστανές. Τα φύλλα αυτά προοδευτικά κάμπτονται προς τα κάτω, ξηραίνονται και παραμένουν στο δέντρο και το χειμώνα.
- Σε περίπτωση που είχαμε την προηγούμενη χρονιά προσβολή (άρα υπάρχουν ξερά φύλλα στα δένδρα το χειμώνα), συνιστάται επέμβαση στο στάδιο Ι (απόσπαση του κάλυκα) με Dodine.

Η Δέσιμο	Ι Απόσπαση του κάλυκα	<i>Gnomonia erythrostoma</i> Προσβολή

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη