



No 14 / 30 Μαρτίου 2014

Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης


Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

ΜΟΝΙΛΙΑ (*Monilinia fructicola*, *Monilinia laxa*, *Monilinia fructigena*)

- Στις πρώιμες περιοχές οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται στην πτώση πετάλων, ενώ αντίστοιχα στις ορεινές περιοχές βρίσκονται στην άνθηση, στάδια ευαίσθητα μολύνσεων (εικόνα 1).
- Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες, αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες μολύνσεων.
- Στους οπωρώνες που δεν έγινε πρόσφατα επέμβαση πρέπει να γίνει άμεσα.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Boscalid, Captan, Cyprodinil, Dithianon, Fludioxonil, Fluopyram, Iprodione, Prochloraz, Propiconazole, Pyraclostrobin, Tebuconazole, Thiophanate-methyl, Thiram, Ziram.
- Να δοθεί προσοχή στην επιλογή των σκευασμάτων για την επίπτωση στους πληθυσμούς φυσικών εχθρών και στις μέλισσες.



**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη