



No 15 / 09 Απριλίου 2014

Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

## ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

### **ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ**

#### A. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ (*Venturia inaequalis* Cooke Wint. *Venturia pirina* Aderhold)

- Οι βροχοπτώσεις δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για τη μόλυνση. Συνιστάται η προστασία των δένδρων με προστατευτικά – θεραπευτικά μυκητοκτόνα, στο 70 – 90% της «πτώσης των πετάλων».
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Bacillus subtilis, Boscalid + Pyraclostrobin, Captan, Cyprodinil, Dithianon + Pyraclostrobin, Fluopyram + Tebuconazole, Fluquinconazole + Pyrimethanil, Mancozeb, Metiram, Myclobutanil, Sulphur, Tebuconazole, Thiophanate-methyl, Trifloxytrobin, Thiram, Ziram (μηλιά και αχλαδιά) Cyproconazole, Difenoconazole, Fenbuconazole, Cyprodinil + Fludioxonil, Folpet + Triadimenol, Kresoxim-methyl, Laminarin (Εγκριση μόνο για μηλιά).



70 – 90% πτώσης πετάλων

#### B. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (*Cydia pomonella* L., Lepidoptera: Tortricidae)

- Σε περίπτωση που σκοπεύετε να εφαρμόσετε σύστημα παρεμπόδισης συζεύξεων (mating disruption), η τοποθέτηση των εξατμιστήρων να γίνει άμεσα με την παραλαβή του Δελτίου.



### Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ (*Panonychus ulmi* Koch, Acari: Tetranychidae)

- Μετά την άνθηση το άκαρι μετακινείται στα φύλλα, όπου τρέφεται και ωοτοκεί.
- Συνιστάται εβδομαδιαία δειγματοληψία 5 φύλλων / δέντρο, από 20 σημασμένα δέντρα.
- Εάν καταμετρηθούν περισσότερα από 20 ακάρεα / φύλλο να γίνει επέμβαση μετά την πτώση των πετάλων με εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα σκευάσματα: Abamectin + παραφινικό λάδι, Acequinocyl, Chlorantraniliprole + Abamectin, Clofentezine, Etoxazole, Fatty acid potassium salt, Paraffin oil, Spirodiclofen, Tebufenpyrad (μηλιά και αχλαδιά) Fenpyroximate, Milbemectin, Pyridaben (μόνο μηλιά).



Η πλήρης πτώση πετάλων

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη