



No 42 / 16 Ιουλίου 2014

Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝΑΡΣΙΑ - ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ*(Anarsia lineatella* Zeller - *Adoxophyes orana* Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)

- Ξεκίνησε η 2^η πτήση του Φυλλοδέτη. Η πτήση της Ανάρσιας συνεχίζεται.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

		Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)	Αριθμός ημερών έως την συγκομιδή (αύξουσα ταξινόμηση)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	24-26 Ιουλίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Bacillus thuringiensis spp. Aizawai (2), Bacillus thuringiensis var. Kurstaki	0
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	19-22 Ιουλίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Methoxyfenozide (3)	7
		Chlorantraniliprole (2)	14
		Chlorantraniliprole + Thiamethoxam (1-2)	14
		Diflubenzuron (2)	30
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	24-26 Ιουλίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Beta-cyfluthrin (2)	7
		Cyfluthrin (1)	7
		Deltamethrin (2)	7
		Emamectin (3)	7
		Etofenprox (2)	7
		Lambda cyhalothrin (2)	7
		Spinosad (3)	7
		Indoxacarb (3)	10
		Phosmet (2)	14
		Chlorpyrifos (2)	20
Chlorpyrifos-methyl (1)	21		

- Στις ποικιλίες που συγκομίζονται μέχρι 25 Ιουλίου δεν απαιτείται επέμβαση.
- Η επέμβαση καταπολεμά αποτελεσματικά και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαφα ροδακινιάς) (*Grapholitha molesta* Busck, Lepidoptera: Tortricidae).
- Προσοχή** να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή.
- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

**ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ****(*Pseudaulacaspis pentagona* Targioni, Homoptera: Diaspididae)**

- Η 1^η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Μόνο σε οπωρώνες που παρουσιάζουν προσβολές συνιστάται καταπολέμηση.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

		Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)	Αριθμός ημερών έως την συγκομιδή με αύξουσα ταξινόμηση
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	23-25 Ιουλίου και επανάληψη στις 30-31 Ιουλίου και 6-8 Αυγούστου	Fatty acid potassium salt (4)	0
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο δράση	19-22 Ιουλίου και επανάληψη στις 2-4 Αυγούστου	Fenoxycarb (2)	14
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με προνυμφοκτόνο δράση	23-25 Ιουλίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Chlorpyrifos (2)	20
		Chlorpyrifos-methyl (2)	21
		Paraffin oil (4)	21
		Spirotetramat (2)	21

- Οι επεμβάσεις για Φυλλοδέτη και Ανάρσια θα καλύψουν σε μεγάλο βαθμό και την βαμβακάδα, ανάλογα με το φυτοπροστατευτικό που θα επιλεγεί.

ΜΟΝΙΛΙΑ (*Monilinia fructicola*, *Monilinia laxa*, *Monilinia fructigena*)

- Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη μολύνσεων.
- Προτείνεται η προστασία των καρπών που πλησιάζουν στην ωρίμανση.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (αριθμός ημερών έως την συγκομιδή):
 - Bacillus subtilis strain QST 713, Fluopyram, Thiophanate-methyl (3)
 - Boscalid + Pyraclostrobin, Cyprodinil, Cyprodinil + Fludioxonil, Difenoconazole, Tebuconazole (7)
 - Propiconazole (14)

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη