



No 5 / 10 Μαρτίου 2014

Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

ΜΟΝΙΛΙΑ (*Monilinia fructicola*, *Monilinia laxa*, *Monilinia fructigena*)

- Στις πρώιμες περιοχές οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται από το στάδιο **D** έως το **F**, ενώ αντίστοιχα στις ορεινές περιοχές βρίσκονται στο στάδιο **C** (εικόνα 1).
- Όλα τα παραπάνω στάδια είναι ευαίσθητα μολύνσεων από τον μύκητα.
- Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες, αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες μολύνσεων.
- Στους οπωρώνες που δεν έγινε πρόσφατα επέμβαση πρέπει να γίνει άμεσα.
- Εάν παραταθεί η άνθηση και συνεχιστεί ο βροχερός καιρός μπορεί να χρειαστεί επανάληψη.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Boscalid, Captan, Cyprodinil, Dithianon, Fludioxonil, Fluopyram, Iprodione, Prochloraz, Propiconazole, Pyraclostrobin, Tebuconazole, Thiophanate-methyl, Thiram.
- Να δοθεί προσοχή στην επιλογή των σκευασμάτων για την επίπτωση στους πληθυσμούς φυσικών εχθρών και στις μέλισσες.
- Με την επέμβαση αυτή επιτυγχάνεται και συνδυασμένη καταπολέμηση του Κορύνεου (*Stigmina carpophylla*).

ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη



Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(www.minagric.gr και www.agrotypos.gr)

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη
Τηλ. 2310 476662
pkpfr@otenet.gr

C Εμφάνιση κάλυκα	
D Εμφάνιση στεφάνης	
E Εμφάνιση στημόνων	
F Άνθηση	
Εικόνα 1. στάδια ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ (φωτογραφίες Α. Υφούλης)	